Anexo 1. *Posición sociológica de la Asociación Clusio multiflorae - Weinmannietum tomentosae Cantillo y Gracia 2013*

Especie	AA	AR	FA	FR	CT I	CT II	CT III	CTR	PS%
Hedyosmum parvifolium	1	0.8	10	3.23	0	1	0	0.36	1.5
Hesperomeles obtusifolia	1	0.8	10	3.23	0	1	0	0.36	1.5
Morella parvifolia	1	0.8	10	3.23	0	1	0	0.36	1.5
Chaetogastra grossa	1	0.8	10	3.23	1	0	0	2.56	2.2
Drimys granadensis	1	0.8	10	3.23	0	0	1	2.56	2.2
Miconia buxifolia	1	0.8	10	3.23	1	0	0	2.56	2.2
Miconia summa	1	0.8	10	3.23	1	0	0	2.56	2.2
Weinmannia auriculata	1	0.8	10	3.23	1	0	0	2.5	2.2
Pentacalia pulchella	3	2.5	10	3.23	2	1	0	5.49	3.7
Linochilus rosmarinifolius	5	4.2	10	3.23	1	4	0	4.00	3.8
Ilex microphylla	3	2.5	20	6.45	1	2	0	3.28	4.1
Morella pubescens	3	2.5	20	6.45	0	2	1	3.28	4.1
Scrobicaria ilicifolia	4	3.4	10	3.23	2	2	0	5.85	4.1
Clusia multiflora	7	5.9	30	9.68	0	4	3	9.13	8.2
Gaiadendron punctatum	13	10.9	40	12.90	2	11	0	9.07	11.0
Weinmannia tomentosa	73	61.3	90	29.03	1	64	8	46.1	45.5

Nota: AA: abundancia absoluta, AR: abundancia relativa, FA: frecuencia absoluta, FR: frecuencia relativa, CT I: categoría de tamaño I (Estrato inferior), CT II: categoría de tamaño II (Estrato medio), CT III: categoría de tamaño I (Estrato superior), CTR: Categoría de tamaño relativa, PS%: posición sociológica.