Anexo 1. *Índice de valor de importancia (IVI) de la Asociación Clusio multiflorae - Weinmannietum*

Especie	AA	AR	FA	FR	DA	DR	IVI 300%	IVI%
Weinmannia tomentosa	73	61.3	90	29.0	325.68	55.6	146.0	48.7
Clusia multiflora	7	5.9	30	9.7	125.97	21.5	37.1	12.4
Gaiadendron punctatum	13	10.9	40	12.9	46.48	7.9	31.8	10.6
Morella pubescens	3	2.5	20	6.5	25.14	4.3	13.3	4.4
Linochilus rosmarinifolius	5	4.2	10	3.2	20.83	3.6	11.0	3.7
Ilex microphylla	3	2.5	20	6.5	1.15	0.2	9.2	3.1
Scrobicaria ilicifolia	4	3.4	10	3.2	7.22	1.2	7.8	2.6
Pentacalia pulchella	3	2.5	10	3.2	10.37	1.8	7.5	2.5
Drimys granadensis	1	0.8	10	3.2	5.25	0.9	5.0	1.7
Hesperomeles obtusifolia	1	0.8	10	3.2	4.86	0.8	4.9	1.6
Weinmannia auriculata	1	0.8	10	3.2	4.81	0.8	4.9	1.6
Hedyosmum parvifolium	1	0.8	10	3.2	3.50	0.6	4.7	1.6
Morella parvifolia	1	0.8	10	3.2	2.00	0.3	4.4	1.5
Miconia buxifolia	1	0.8	10	3.2	1.50	0.3	4.3	1.4
Miconia summa	1	0.8	10	3.2	0.50	0.1	4.2	1.4
Chaetogastra grossa	1	0.8	10	3.2	0.15	0.0	4.1	1.4

Nota: AA: abundancia absoluta, AR: abundancia relativa, FA: frecuencia absoluta, FR: frecuencia relativa, DA: dominancia absoluta, DR: dominancia relativa, IVI 300%: Índice de valor de importancia al 300%, IVI%: Índice de valor de importancia relativo al 100%.