Anexo 1. *Índice de predominio fisionómico (IPF) de la Asociación Clusio multiflorae - Weinmannietum tomentosae*

Especie	DA	DR	CA	CR	ABA	ABR	300% IPF	IPF %
Weinmannia tomentosa	73	61.34	325.68	55.63	1.75	62.75	179.72	59.9
Clusia multiflora	7	5.88	125.97	21.52	0.34	12.12	39.52	13.2
Gaiadendron punctatum	13	10.92	46.48	7.94	0.27	9.65	28.52	9.5
Morella pubescens	3	2.52	25.14	4.29	0.10	3.68	10.49	3.5
Linochilus rosmarinifolius	5	4.20	20.83	3.56	0.07	2.54	10.30	3.4
Scrobicaria ilicifolia	4	3.36	7.22	1.23	0.05	1.77	6.37	2.1
Pentacalia pulchella	3	2.52	10.37	1.77	0.03	1.06	5.35	1.8
Ilex microphylla	3	2.52	1.15	0.20	0.03	1.04	3.76	1.3
Drimys granadensis	1	0.84	5.25	0.90	0.05	1.65	3.38	1.1
Hesperomeles obtusifolia	1	0.84	4.86	0.83	0.04	1.49	3.16	1.1
Weinmannia auriculata	1	0.84	4.81	0.82	0.01	0.41	2.07	0.7
Hedyosmum parvifolium	1	0.84	3.50	0.60	0.01	0.28	1.72	0.6
Morella parvifolia	1	0.84	2.00	0.34	0.01	0.51	1.69	0.6
Miconia buxifolia	1	0.84	1.50	0.26	0.01	0.30	1.40	0.5
Chaetogastra grossa	1	0.84	0.15	0.03	0.01	0.48	1.34	0.4
Miconia summa	1	0.84	0.50	0.09	0.01	0.28	1.21	0.4

Nota: DA: densidad absoluta, DR: densidad relativa, CA: cobertura absoluta, CR: cobertura relativa, ABA: área basal absoluta (m^2), ABR: área basal relativa, IPF 300%: Índice de predominio fisionómico al 300%, IPF%: Índice de predominio fisionómico al 100%.